
กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

ขั้นตอนการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

ชุดอุปกรณ์ออกหน่วย

1. กระบอกฉีดยา (Syringe) ขนาด 1 ml.
2. หัวเข็มสำหรับดูดวัคซีนเบอร์ 22 ขนาด 1 นิ้ว
3. ภาชนะบรรจุสำลี และแอลกอฮอล์ 70%
4. กระติกบรรจุวัคซีน และก้อนน้ำแข็ง (Ice Pack)
5. หน้ากาก (Mask)
6. เจลล้างมือ
7. ถุงมือยาง
8. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
   เก็บในตู้แช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส
9. ใบรับรองการฉีดวัคซีนพร้อมเหรียญ
10. แบบกรอกบันทึกรายละเอียดสัตว์ที่รับการฉีดวัคซีน





กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

ขั้นตอนการเตรียมการออกหน่วย

เตรียม Ice Pack วางด้านล่าง และด้านข้างของกระติก



วางวัคซีนระหว่าง Ice Pack



วาง Ice Pack ไว้ด้านบน



ปิดฝากระติก



กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

นำวัคซีน ออกจากกระติก



สวมถุงมือยาง



เตรียมกระบอก ฉีดยา 3 cc.



ใส่หัวเข็มเบอร์ 22 กับกระบอกฉีดยา



นำวัคซีนออก จากกระติก



กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

ขั้นตอนการฉีดวัคซีน (ต่อ)

เขย่าขวดวัคซีน



เช็ดปากขวดวัคซีน ด้วยแอลกอฮอล์



ดูดวัคซีนออก จากขวดวัคซีน



ให้ได้ปริมาณ 1cc. (1ขวด/ตัว)



ถอดหัวเข็มที่ใช้ ดูดวัคซีนออก



ใส่หัวเข็มเบอร์ 22 กับกระบอกฉีดยา



กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

วิธีจับบังคับสุนัข





1. ใช้มืออ้อมมากอดบริเวณต้นคอ โดยให้สุนัขแนบชิดกับตัว
2. ใช้มืออีกข้างกอดบริเวณสะโพกด้านท้ายสุนัข

กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

วิธีจับบังคับแมว

มือขวาจับ
ที่หนังคอให้แน่น



มือซ้ายรวบ
สองขาหลัง



กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

วิธีจับบังคับแมว (ต่อ)



ใช้ผ้าหอคลุมเท้าทั้งสี่ข้าง



ใช้สวิงครอบ



ให้เกาะบนต้นไม้
ดึงหนังคอให้แน่น

กรุงเทพมหานคร

การใช้เชือกผูกปากสุนัข

ทั้งชีวิต..เราดูแล



มัดเชือกให้เป็นบ่วง



ให้บ่วงคล้องอยู่ประมาณกึ่งกลางปากและปมอยู่ด้านล่าง ดึงเชือกให้ตึงมือ



รวบปลายเชือกผูกเป็นเงื่อนกระตุกไว้ด้านหลังหู

กรุงเทพมหานคร

วิธีการฉีดวัคซีนเข้าตัวสัตว์

ทั้งชีวิต..เราดูแล

แหวกขนสัตว์ให้เห็นผิวหนังอย่างชัดเจน



ใช้แอลกอฮอร์เช็ดที่ผิวหนังสัตว์ เพื่อฆ่าเชื้อ



มือซ้ายดึงหนังขึ้นเล็กน้อย



มือขวาแทงเข็มเข้าใต้ผิวหนังแล้วดันกระบอกสูบให้วัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์



ดึงกระบอกฉีดยาออก พร้อมใช้แอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่ฉีดอีกครั้ง



กรุงเทพมหานคร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

ทั้งชีวิต..เราดูแล

- ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
- ควรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อสัตว์มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
- ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก 1 เดือน
- กรณีฉีดวัคซีนในสัตว์อายุ 2 เดือนหรือต่ำกว่า 3 เดือน ให้นัดหมายฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้งหลังจากครั้งแรก 1 เดือน
- จากนั้นฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคปีละ 1 ครั้ง
- งดอาบน้ำหลังจากฉีดวัคซีนเป็นเวลา 7 วัน
- ให้สังเกตอาการแพ้วัคซีนในสัตว์หลังฉีดวัคซีน 15 นาที

กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ ศบส. ต้องเตรียม

ทั้งชีวิต..เราดูแล

1. ชุดกล่องอุปกรณ์ออกหน่วย 
2. กระติกบรรจุวัคซีนที่ใส่ Ice Pack 
3. บุคลากร 2 คน ได้แก่ พยาบาล และผู้ช่วย 

กรุงเทพมหานคร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งชีวิต..เราดูแล

1. ทำวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขเท่านั้นใช่หรือไม่?

= สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด สามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ จึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด

2. หลังคนถูกสุนัขบ้ากัดจะเริ่มแสดงอาการเมื่อไหร่?

= ตั้งแต่ได้รับเชื้อจนแสดงอาการ อาจใช้ระยะเวลาฟักตัวต่างกัน ตั้งแต่ 4 วันถึง 4 ปี โดยผู้ป่วยประมาณ 70% จะเป็นโรคนี้ภายใน 3 เดือนหลังถูกกัด และประมาณ 96% จะเป็นโรคนี้ภายใน 1 ปีหลังถูกกัด

กรุงเทพมหานคร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งชีวิต..เราดูแล

3. สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร?

- ระยะที่ 1 : สุนัขจะมีอาการเซื่องซึม โดยเปลี่ยนแปลงนิสัยเป็นแบบก้าวร้าวและดุร้ายประมาณ 2-3 วัน

- ระยะที่ 2 : สุนัขจะมีความก้าวร้าวและดุร้ายขึ้นอย่างชัดเจน กัดทุกอย่าง น้ำลายไหลยืด กินน้ำกินอาหารไม่ได้ ส่งเสียงร้องโหยหวน เกิดการอัมพาตของกล้ามเนื้อหลายส่วนประมาณ 1-7 วัน ซึ่งเป็นระยะการแพร่โรคที่สำคัญ เพราะผู้เลี้ยงอาจมีโอกาสสัมผัสโรคได้ง่าย

- ระยะที่ 3 : สุนัขจะตายเนื่องจากกล้ามเนื้อในการควบคุมระบบการหายใจเป็นอัมพาต โดยใช้เวลาประมาณ 2-4 วัน

กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

4. ถ้าถูกสัตว์กัดหรือข่วน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

- ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา 10 นาที หากมีเลือดออก ควรปล่อยให้เลือดไหลออก อย่าบีบหรือเค้นแผล เพราะอาจทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นได้
- ใส่ยา เช่น เบตาดีน ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์ 70% ไม่ควรเย็บแผลทันที ควรรอไว้ 3-4 วัน แต่หากเลือดออกมาก หรือแผลมีขนาดใหญ่อาจเย็บแผลหลวมๆ และใส่ท่อระบายไว้
- กักดูอาการสัตว์ โดยให้น้ำและอาหารตามปกติอย่างน้อย 14 วัน ให้แจ้ง สสธ. 0-2245-3311 หรือสายด่วน กทม. 1555 ทันที
- พบแพทย์ทันทีที่ถูกกัด

กรุงเทพมหานคร

ทั้งชีวิต..เราดูแล

สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

โทร. 0-2248-7417 , 0-2245-3311

โทรสาร 0-2247-2719

http://www.vphbma.com

vphbma@hotmail.com

